

Unità idrogeologica	Unità CARG carta geologica	Unità tettoniche profilo geologico
1 permeabilità alta	SLN1GR, CBN2b, RIM8TB, AFN2b, BEN3b, AFN3X, BEN5Vb	PL, FQ, MT[1]
2 permeabilità media	LBN4, AAL1X, AFN2c1, AAL2X, AAL1X, AFN2b, AFN3V1, BEN1b, BEN5Va	PC, AC, MC, FC, L

[1] Livelli litoranei 10 m sul fondalmare e non percepibili risalto sul lineare batimetrico contorno di depositi fini di origine lacuale, palustre, di torbiera, o glaciale indifferenziati

Legendo

P_1	Depositi fluviali prevalentemente grossolani eterometrici costituenti i principali fondovalle sulle aree pianeggianti e non (Fiume Chiese) (Olocene) Fluvial deposits. Unità Stratigrafica prevalentemente incoerente
P_2	Depositi alluvionali in conoide pedemontane alle unità LBN, CSN, pp. CSN2a, RIM2a, AFN2a, RIM1b
P_3	Depositi fluviali glaciali costituiti da ciottoli grossi e ghiaie ciottolose con clasti eterometrici di quarziti, serpentiniti, gneiss, porfiroidi. Unità Stratigrafica prevalentemente incoerente. Alluvione in conoide pedemontane alle unità LBN, CSN, pp. CSN2a, RIM2a, RIM1a, AFN2a, RIM1b
M_1	Depositi glaciali indifferenziati costituiti da clasti eterometrici angolosi e subangolosi, discreti, longest axis 1-2 m, in matrice sabbiosa-limosa, con ciottolato e ghiaia subordinata, ciottolato e ghiaia prevalenti, con ciottolato e ghiaia subordinata, con ciottolato e ciottolato e ghiaia prevalenti, con ciottolato e ciottolato e ciottolato e